



Powierzchnia tablicowa
 Tablica informacyjna powinna być odporna na warunki atmosferyczne i wytrzymała na napór wiatru, deszczu i śniegu; Wydruk wielkoformatowy wodoodporny, wysoko- jakościowy, o wysokiej odporności na ścieranie. Zabezpieczony warstwą polimerową z pokryciem anti-UV oraz antygraffiti. Rozdzielczość wydruku min 1440 dpi.

Wspornik drewniany



Tablica - Konsola (T1 i T5)



Propozycja montażu
 Konsola z tablicą powinna być posadowiona/ zakotwiona w gruncie w sposób uniemożliwiający jej przewrócenie i wyrwanie; elementy drewniane stykające się z gruntem powinny być zabezpieczone za pomocą metalowych kotew z kotnierzem

Posadowienie
 Szczegóły posadowienia do uzgodnienia z producentem/ wykonawcą

P.W. "KaNoID" Michał Namysłowski 41-902 BYTOM, ul. Kwiatowa 10 tel. 691 73 66 95, 601 422 132, fax 32 282 60 95 e-mail: p.kanoid@interia.pl					
Inwestor Gmina Ustron ul. Rynek 1, 43-450 Ustron					
Nazwa Poprawa stanu naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu					
Tytuł Projekt przyrodniczego zagospodarowania terenu					
Tytuł rysunku Schemat konstrukcji tablicy typu konsola					
Data 04.2018 r.	Data 04.2018 r.	Data 04.2018 r.	Data 04.2018 r.	Data 04.2018 r.	Data 04.2018 r.
Opracował mgr Natalia Durko-Karpińska					



fot. Natalia Durka-Kamińska

Rdestowiec ostrokończysty
(*Reynoutria japonica*)

Pochodzenie: południowa Azja - Japonia, Wietnam, południowo-zachodnie Chiny, Tajwan, Sachalin.

Zagrożenia: wypiera rodzime gatunki i drastycznie zmienia warunki siedliskowe



fot. Natalia Durka-Kamińska

Nawłóć kanadyjska (*Solidago canadensis*)

Pochodzenie: Ameryka Północna.

Zagrożenia: Bardzo ekspansywna - tworzy gęste połacie, wypierając inne gatunki przez co zmniejsza różnorodność biologiczną opanowanych siedlisk.



fot. Michał Zarzecki

Trzcinnik piaskowy (*Calamagrostis epigeios*)

Pochodzenie: Europa, Azja, Afryka. W Polsce gatunek rodzimy.

Zagrożenia: Bardzo ekspansywny - wypiera inne gatunki przez co zmniejsza różnorodność florystyczną zbiorowisk




fot. Natalia Durka-Kamińska

Niecierpek gruczołowaty
(*Impatiens glandulifera*)

Pochodzenie: Himalaje.

Zagrożenia: Wkracza na wilgotne łąki, do lasów i zarośli nadrzecznych skąd wypiera rodzime gatunki i ogranicza różnorodność biologiczną.



fot. Michał Zarzecki

Firletka poszarpana
(*Lychnis flos-cuculi*)



fot. Michał Zarzecki

Rzepik pospolity
(*Agrimonia eupatoria*)



Centuria pospolita
(*Centaureum erythraea*)

fot. Michał Zarzecki



fot. Natalia Durka-Kamińska

Dziewięciśł bezłodygowy
(*Carlina acaulis*)



fot. Natalia Durka-Kamińska

Zajac szarak
(*Lepus europaeus*)




fot. Michał Zarzecki

Szablak zwyczajny
(*Sympetrum vulgatum*)



fot. Michał Zarzecki

Żmija zygzakowata
(*Vipera berus*)



fot. Marcin Moga (Lic. CC 2.0)

Bazant zwyczajny
(*Phasianus colchicus*)